

С нами рости легче

avgust 
crop protection



Комплексная система
защиты картофеля
препаратами компании
«Август»



АО Фирма «Август» в России
129515, г. Москва, ул. Цандера, 6
+7 (495) 787-08-00

avgust.com

avgust 
crop protection

Содержание

Комплексная система защиты картофеля от сорных растений препаратами компании «Август».....	2
Комплексная система защиты картофеля от болезней и вредителей препаратами компании «Август».....	4
Болезни картофеля и меры борьбы с ними	6
Задача картофеля, выращиваемого на различные цели	18
Защита картофеля на семенные цели	20
Защита картофеля для промышленной переработки (в т. ч. на картофель фри, а также чипсовых сортов)	24
Защита товарного картофеля.....	28
Все для защиты картофеля	32
Перечень препаратов компании «Август», рекомендованных для применения на картофеле	44
Классификация механизмов действия действующих веществ препаратов с указанием кода резистентности	48
Контакты	52

Комплексная система защиты картофеля от сорных растений препаратами компании «Август»




Схема защиты картофеля от сорных растений		00	03 - 05	11	15	19	51	55 - 59	59 - 65	69 - 89	91 - 93
Вредный объект, назначение	До посадки	Посадка	Прорастание	Всходы	Высота ботвы 5 см	Высота ботвы 15 см	Активный рост ботвы	Бутонизация – цветение	Рост клубней	Созревание клубней	Увядание ботвы
Все двудольные и злаковые сорняки		Торнадо® 500; Торнадо® 540									
Однолетние двудольные сорняки			Нексус®*; Сахара®				Гербитокс®*; Корсар®*				
Однолетние двудольные и злаковые сорняки			Гамбит®; Камелот®*; Трейсер®								
Однолетние двудольные и злаковые сорняки		Лазурит®; Лазурит® Ультра (однократно или первая обработка)			Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра						
Многолетние (пырей) и однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки					Эскудо® (однократно или дробно до высоты ботвы 20 см)						
Однолетние и многолетние (пырей) злаковые сорняки					Видфайтер®**; Граминион®; Квикстеп®; Миура®						
Десикация									Сахара®; Суховей®		

Комплексная система защиты картофеля от болезней и вредителей препаратами компании «Август»



Схема защиты картофеля от болезней и вредителей		00	03 - 05	11	15	19	51	55 - 59	59 - 65	69 - 89	91 - 93	
Вредный объект, назначение	До посадки	Посадка	Прорастание	Всходы	Высота ботвы 5 см	Высота ботвы 15 см	Активный рост ботвы	Бутонизация – цветение	Рост клубней	Созревание клубней	Увядание ботвы	
Ризоктониоз		Идикум®; Интрада®; Рондаш®*; Байсайд®**; Синклер®; Бенорад®										
Фитофтороз	Рондаш®*;						Спайк®; Инсайд®; Метаксил®; Кумир®; Ордан®; Ордан® МЦ; Либертадор®; Талант®					
Альтернариоз							Ралли®; Интрада®; Раёк®; Эвклид®; Балий®**; Тирада®					
Антракноз	Байсайд®**							Балий®**; Геллерт®**				
Фузариоз	Рондаш®*; Бенорад®; Синклер®											
Серая гниль	Синклер®; Идикум®							Ралли®; Эвклид®				
Серебристая парша	Интрада®; Рондаш®*											
Парша обыкновенная	Тиацин Био®; Рондаш®*; ТМТД ВСК											
Питиозная гниль	Идикум®; Рондаш®*								Либертадор®			
Бактериальные гнили	ТМТД ВСК						Тирада®; Кумир®; Ордан®					
Стеблевая и картофельная клубневая нематоды	Пронематод®*											
Проволочник, колорадский жук, хрущи, совки, тли	Скутум®***, Табу®, Табу® Супер											
Колорадский жук, картофельная моль, коровка, тли							Алиот; Аспид®**; Борей®; Борей® Нео; Жукоед® Био; Коллайдер®; Мамба®; МатринБио® (в т. ч. в органическом земледелии); Сирокко®; Скарабей®**; Скутум®; Стилет®**; Шарпей®					
Гнили при хранении										Синклер®****		

Болезни картофеля и меры борьбы с ними

Первый и очень важный этап в системе защиты картофеля – проправливание. Его проводят двумя способами: обработка клубней перед посадкой или опрыскивание клубней и дна борозды при посадке. Возможно и сочетание этих способов для конкретной партии картофеля или для конкретного поля, в зависимости от уровня их зараженности.

Проправливание позволяет на ранних этапах роста культуры контролировать наиболее вредоносные заболевания, снижающие количество и качество урожая картофеля.

В период вегетации наибольшую опасность представляют фитофтороз и альтернариоз. На них и должна быть направлена фунгицидная защита. Однако большинство препаратов эффективно контролирует только одну из этих болезней, а против второй действуют лишь профилактически и при эпифитотии защищают недостаточно. Поэтому следует комбинировать фунгициды, направленные на борьбу с альтернариозом, и препараты, «специализирующиеся» на фитофторозе.

Среди заболеваний картофеля, представляющих угрозу для урожая, также распространены: ризоктониоз, антракноз, фузариоз, бактериозы, серая гниль, питиум, парша серебристая и обыкновенная. На отдельных территориях большой вред качеству урожая наносит стеблевая (клубневая) картофельная нематода.

В период хранения клубней основной риск представляют патогены, которые могут попасть

С нами растя легче

Ризоктониоз

Rhizoctonia solani J.G. Kuhn

Описание болезни

На клубнях склероции темно-коричневого или черного цвета, единичные или многочисленные язвы. Загнивание глазков и проростков. На корнях и столонах точечные или удлиненные язвы. На стеблях сухая язвенная гниль и «белая ножка».

Рекомендации по защите

Обработка клубней перед посадкой или обработка клубней и дна борозды во время посадки препаратами или их комбинациями: Идикум, 4,5 л/га; Идикум, 4 л/га + Интранда, 1 л/га; Рондаш*, 3 л/га; Синклер, 0,9 л/га + Интранда, 1 л/га.

* – завершается регистрация препарата

Для получения хорошего урожая картофеля важен не только правильный выбор технологии возделывания культуры, но и грамотно подобранная система защиты на всех этапах – от обработки клубней до закладки урожая на хранение.

в хранилище с поля. Чтобы минимизировать риски развития гнилей при хранении, необходимо помнить о следующих факторах:

- здоровом посадочном материале;
- предшественниках и месте культуры в севообороте;
- сбалансированном внесении удобрений;
- десикации ботвы картофеля перед уборкой;
- минимизации травмирования клубней при уборке;
- лечебном периоде;
- соблюдении режимов хранения для столовых и семенных партий картофеля.




Фитофтороз

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Описание болезни

На листьях бурые пятна. С нижней стороны листьев на пятнах образуется белый налет – спороношение патогена. Со временем листья полностью буреют и погибают. На стеблях пятна бурого цвета, обычно удлиненные. На клубнях пятна различной формы, слегка вдавленные, твердые на ощупь, серовато-бурового цвета. При разрезе – ржаво-бурая пораженная ткань.



Рекомендации по защите


Обработка препаратами Спайлк, Метаксил, Инсайд, Ордан МЦ, Либертадор, Талант.

Альтернариоз

Alternaria spp.

Описание болезни

Первые инфекционные пятна на поверхности листьев, в исключительно редких случаях на поверхности стеблей. В большинстве случаев появляются в период бутонизации. На листьях образуются многочисленные, сливающиеся, хаотично локализованные темно-бурые или почти черные пятна. Сами пятна на поверхности могут иметь характерные концентрические круги.



Рекомендации по защите

Обработка препаратами на основе стробилуринов, триазолов, пиридинкарбоксамидов: Раёк, Интранда, Эвклид, Ралли, Балий*.

* – завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Антракноз

Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes

Описание болезни

На корнях и столонах темные пятна. На стеблях удлиненные единичные, а в дальнейшем сливающиеся светлые пятна. На поверхности пятен черные, гладкие или со щетинками склероции. На клубнях светло-коричневые или темно-серые пятна, а также черные склероции.



* – завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Рекомендации по защите

Обработка клубней и дна посадочной борозды препаратом Байсайд*, 1,2 - 1,5 л/га или комбинацией Байсайд*, 1,2 л/га + Идиум, 3 л/га. Дополнительно следует предусмотреть на 40 - 45-й день применения препаратов на основе триазолов, стробилуринов, карбоксамидов - Балий*, Геллерт* - с высокими нормами рабочей жидкости (до 500 л/га) и с последующим поливом при возможности.



Фузариоз

Fusarium spp.

Описание болезни

На клубне вдавленные пятна – либо не отличающиеся от цвета кожуры, либо темно-серого оттенка. Пораженная ткань может иметь характерную складчатость, под ней многочисленные полости. В дальнейшем клубни усыхают. Некоторые виды *Fusarium spp.* вызывают увядание растений. Проявление начинается с пожелтения и повисания листьев с последующим увяданием всего растения и его засыханием.



Рекомендации по защите

Протравливание клубней препаратами (включение в схемы протравливания): Рондаш*, Бенорад, Синклер.

* – завершается регистрация препарата



Серая гниль

Botrytis cinerea Pers.

Описание болезни

На листьях коричневатые или светло-серые округлые пятна. Поражение довольно часто начинается с кончиков листьев. Серое спороношение патогена появляется с двух сторон листа. На стеблях - локализованные загнивающие коричневые пятна, увеличивающиеся в длину на несколько сантиметров. На клубнях заболевание развивается по типу сухой гнили. Независимо от пораженных органов, инфицированные ткани покрыты густым серым спороношением возбудителя заболевания.

На инфицированных тканях в дальнейшем могут образовываться черные склероции.



Рекомендации по защите


Включение в схемы проправливания препаратов Идикум, Синклер. Против патогенных грибов из родов *Botrytis*, *Sclerotinia* эффективны фунгициды на основе боскалида: Эвклид (боскалид + азоксистробин), Ралли (боскалид + пираклостробин). Ближе к концу вегетации следует опрыскивать посадки комбинациями препаратов Талант, 2,5 л/га + Эвклид, 0,5 л/га или Талант, 2,5 л/га + Ралли, 0,5 л/га.

Серебристая парша

Helminthosporium solani Durieu et Mont

Описание болезни

На корнях и столонах пятна от светло- до темно-коричневого цвета. На клубнях пятна от светло- до темно-серого или серебристого цвета. На пятнах возможно наличие «сажистого» налета и черных склероциев. Отмечается потеря тургора.



Рекомендации по защите

Включение в схемы проправливания препаратов Интранда, Рондаш*.

* - завершается регистрация препарата

Питиум

Pythium spp.

Описание болезни

Инфицированные клубни выделяют избыточное количество влаги, а при разрезании пораженная ткань имеет сероватый или кремовый оттенок и отделена от здоровой более темной полосой (коричневого или темно-коричневого цвета). При контакте с воздухом инфицированная мякоть клубня темнеет. Возможно присутствие легкого рыбного запаха. Текстура мягкая.



Рекомендации по защите

Обработка клубней перед посадкой препаратами Идикум, Рондаш*; применение системы защиты от Оомицетов в период вегетации и опрыскивание антиспорулянтами (Либертадор) в конце вегетации. Своевременные десикация и дозревание. Бережная уборка и закладка на хранение.

* – завершается регистрация препарата



Бактериозы

«Черная ножка», мокрая (*Pectobacterium spp.*, *Dickeya spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*) и кольцевая (*Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*) гнили

Описание болезни

Поражаются все органы картофеля. На клубнях появляются пятна от похожих по цвету на кожуре до темных, мякоть клубня загнивает и превращается в однородную массу, которая в зависимости от бактериального патогена имеет ту или иную консистенцию и запах. То же самое относится к стеблям и другим органам растения.



Рекомендации по защите


Если на клубнях содержится значительное количество бактерий *Pectobacterium spp.* или *Dickeya spp.*, то обязательно применение препарата ТМТД ВСК, 10 - 15 л/га для обработки при посадке или перед посадкой – это поможет помешать распространению бактериозов. В период вегетации дополнительно для защиты от распространения бактериозов в поле рекомендуется применение препаратов, содержащих бактерицид тирам, например, фунгицида Тирада, 3 - 4 л/га, или препаратов на основе меди – Ордан, Кумир.

Обыкновенная и сетчатая парши

Streptomyces spp.

Описание болезни

Поражаются все подземные органы растения, но главным образом клубни, на которых образуются различные язвы, коросты и т. д. Болезни подвержены в первую очередь молодые клубни, в которые патоген попадает через поры, механические повреждения, чечевички, как вторичная инфекция и т. д. В начале инфекционного процесса повреждения малозаметны, но со временем разрастаются и могут покрывать весь клубень. По цвету либо не отличаются от клубня, либо со временем темнеют и приобретают темно-бурый цвет.



Рекомендации по защите

Применение проправителей при посадке для обработки клубней и дна борозды: Тиацин Био, 5 л/га, ТМТД ВСК, 10 - 15 л/га, Рондаш*, 2,5 - 3 л/га. Обеспечение полива в критической фазе – период формирования клубней (фаза начало бутонизации – цветения и через 2 – 3 недели после нее). Обеспечение в этот период влажности почвы 70 - 80 %.

* – завершается регистрация препарата



С нами расти легче

Стеблевая и картофельная клубневая нематоды

Ditylenchus dipsaci Kuhn и *Ditylenchus destructor* Thorne

Описание

Патологический процесс идет по типу сухой гнили. Клубни без видимых признаков поражения, недавно инфицированные при разрезании содержат белые вкрапления рыхлой или зернистой консистенции, локализованные под кожурой. При нарастании численности нематод пораженная ткань увеличивается в размерах, темнеет и приобретает темно-бурый или почти черный цвет. На поверхности клубня заболевание проявляется как темное пятно с металлическим или серым блеском. На более поздней стадии патогенеза кожура проваливается и растрескивается.



Рекомендации по защите

Пронематод* (фостиазат, 100 г/кг), 20 - 30 кг/га. Препарат надежно контролирует цистообразующих и свободноживущих нематод. Малоподвижен в почве – проявляет стабильно высокую эффективность. Обладает контактным и фумигационным действиями на нематод, находящихся в почве в корнеобитаемой зоне. Вредители погибают от паралича дыхательных органов и общего паралича организма, гибель наступает через несколько часов.

* – завершается регистрация препарата

Защита картофеля, выращиваемого на различные цели

Схема защиты должна быть пересмотрена в следующих случаях:

- Для сортов, чувствительных к метрибузину, в том числе выращиваемых на переработку – чипсы, фри (см. примечания ниже).
- Для картофеля, выращиваемого на семенные цели (категория суперэлита), следует увеличить количество инсектицидных обработок препаратами, отличающимися по механизму действия. Также необходимо сократить интервалы между фунгицидными опрыскиваниями до 4 - 7 дней в период эпифитотии.
- Для картофеля, выращиваемого в засушливых регионах, а также в регионах с двумя оборотами за сезон, следует усилить защиту против альтернариоза (*Alternaria solani* и *A. alternata*). Здесь нужно ввести дополнительные обработки препаратами **Эвклид**, **Интрауда**, **Раёк**, **Тирада**, **Балий***, а сроки начала обработок против альтернариоза сместить на более ранние, до смыкания ботвы.
- Для картофеля, выращиваемого в условиях, благоприятных для развития фитофтороза (*Phytophthora infestans*), требуется сократить интервал между обработками, провести профилактическое раннее опрыскивание при высоте растений 15 - 20 см контактными или трансламинарными препаратами.
- При эпифитотии (полевом спороношении) фитофтороза к системным фунгицидам

Предложенные в брошюре схемы защиты являются базовыми. Они построены с учетом основных вредных объектов, характерных для большинства регионов промышленного возделывания картофеля.

- необходимо добавлять препараты, способные подавлять зооспоры патогена, например, **Либертадор**, который проявляет действие в отношении высвобождения зооспор, их подвижности, а также образования ооспор уже через 60 мин. после обработки. Пример надежной комбинации: **Спайк**, 2,5 л/га + **Либертадор**, 0,5 л/га.
- Для семенного картофеля, у которого по результату клубневого анализа было выявлено превышение значений по заражению видами бактерий, в частности *Pectobacterium*, *Dickeya*, следует предусмотреть обработку клубней при посадке препаратом **ТМТД ВСК**, от 10 - 15 л/га (пересчет дозировки в литры на гектар).
- Для полей, зараженных возбудителем антракноза, помимо обработки клубней протравителями **Байсайд***, 1,2 - 1,5 л/га, **Идиум**, 4 л/га + **Интрауда**, 1 л/га, **Идиум**, 3 л/га + **Байсайд***, 1 л/га нужно предусмотреть через 40 - 45 дней после всходов применение фунгицидов из классов триазолов, стробилуринов и карбоксамидов: **Балий*** и **Геллерт*** с высокими нормами расхода рабочей жидкости (до 500 л/га) и при возможности – с последующим поливом.
- При появлении признаков серой гнили нужно включать в фунгицидные схемы защиты **Ралли** и **Эвклид** последовательно – они обеспечат защиту от заболеваний, а также будут контролировать альтернариоз.

С нами растя легче

Примечания к таблицам с системами защиты картофеля

Протравливание клубней и обработка дна борозды

- Если протравливание клубней будет проводиться до посадки, необходимо снизить норму расхода **Идиума** до 1 л/т, либо для обработки клубней перед посадкой применить **Синклер**, 0,2 л/т, а при посадке – **Идиум**, 4,5 л/га (расход рабочей жидкости – 100 - 150 л/га).
- Препарат **Скутум**** при протравливании клубней и опрыскивании дна борозды во время посадки может не применяться, если нет заселенности полей проволочником, совкой, хрущом. Применение **Скутума**** рекомендуется в регионах с высоким уровнем резистентности колорадского жука к имидаклоприду.
- Рондаш***** рекомендуется включать в схемы протравливания для обработки партий семян при обнаружении возбудителей фузариоза, фитофтороза, птицума и ризоктониоза.
- Байсайд*** следует включать в схемы протравливания для партий семян, зараженных антракнозом, или на полях с наличием этого патогена.

Гербицидные обработки

- В качестве альтернативы препарату Камелот* можно использовать **Лазурит Ультра**, 0,8 - 1,2 л/га. Также есть более доступный по цене, но менее технологичный вариант – гербицид **Лазурит** в форме смачивающегося порошка.
- Для сортов картофеля, чувствительных к метрибузину, можно использовать почвенные гербициды, применяемые строго до всходов картофеля: **Гамбит** (прометрин, 500 г/л), **Камелот*** (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л). Кроме того, на всех видах картофеля, в том числе чипсовом, – **Нексус*** (фомесафен, 240 г/л). На сортах, чувствительных к метрибузину, они применяются до всходов в следующих дозировках:
 - Камелот***, 3 - 4 л/га (в зависимости от почвенных условий);
 - Камелот***, 3 - 3,5 л/га + **Трейсер**, 0,2 л/га;

- Гамбит**, 3 л/га + **Трейсер**, 0,2 л/га;
- Нексус***, 1,25 л/га + **Трейсер**, 0,2 л/га.

При обработке сортов картофеля, чувствительных к метрибузину, по всходам эффективны следующие препараты: **Корсар***, **Эскудо**, **Миура**, **Квикстеп**; или их смеси: **Корсар***, 1,5 л/га + **Эскудо**, 0,02 - 0,025 кг/га; **Корсар***, 1,5 л/га + **Миура**, 1 л/га.

Фунгицидные обработки

- Во избежание возникновения устойчивости патогенов к воздействию пестицидов необходимо чередовать в системе обработок препараты, содержащие активные ингредиенты с разными механизмами действия (см. таблицу 5 на стр. 48).
- В схемы защиты картофеля при необходимости увеличения числа обработок можно добавлять препараты **Талант**, **Ордан**, **Ордан МЦ**, **Кумир**, **Тирада** и дополнительно встраивать их в систему обработок в основном во второй период вегетации – в фазе созревания клубней.
- Для контроля возбудителей серой (*Botrytis*) и белой (*Sclerotinia*) гнилей, а также альтернариоза (*Alternaria*) во второй период вегетации можно использовать препараты **Эвклид** и **Ралли**.
- Для контроля и ограничения распространения антракноза в случае его развития к фунгицидам, запланированным в схеме, необходимо добавлять препараты: **Балий*** и **Геллерт***, они обеспечивают защиту не только от антракноза, но и от альтернариоза. Расход рабочей жидкости – 500 л/га.

Инсектицидные обработки

- Для картофеля на семена весь перечень инсектицидов против переносчиков вирусов указан в таблице 4 (стр. 44).
- Применять инсектициды следует совместно с адьювантом **Полифем** или **Аллюр**.

* – завершается регистрация препарата для применения на картофеле
 ** – завершается регистрация препарата для применения данным способом
 *** – завершается регистрация препарата

Защита картофеля на семенные цели

«Для защиты от основных заболеваний используем смесь Идикум + Интранда во время посадки».

Опыт защиты картофеля на семенные цели

Тульская область, ООО «Спасское» имени В. А. Стародубцева

Соболев Владислав Александрович,
ведущий агроном:

«Мы уже давно активно работаем с препаратами компании «Август» для защиты картофеля и за это время полностью убедились в их качестве и надежности.

Один из самых важных и ответственных этапов – посадку – доверяем «августовским» протравителям Идикум и Интранда. Уже не первый год они подтверждают свою эффективность. Благодаря смеси этих препаратов мы взяли под контроль ризоктониоз и получили надежную профилактику от серебристой парши, обеспечив качественный здоровый урожай без признаков поражения болезнями и с выровненной семенной фракцией.

В течение вегетации используем проверенные временем фунгициды Метаксил и Инсайд. Метаксил обладает хорошим соотношением цены и качества, применяем его в первых обработках. Инсайд подключаем в самые ответственные и тяжелые периоды вегетации, он отлично справляется с фитофторой и обеспечивает стабильную защиту.

Три года назад по рекомендации региональных менеджеров фирмы включили в систему защиты препарат Либертадор. Сегодня это уже наша палочка-выручалочка при вспышке фитофтороза. Препарат не смывается водой, что особенно важно для полей под орошением. Так же используем его

В. А. Соболев



С нами расти легче

Клубни нового урожая на растениях, защищенных смесью Идикум + Интранда



Поле картофеля под защитой препаратов «Августа»



Подготовка к учету. В. А. Соболев и «августовцы» А. И. Анисьев и А. В. Шуляк



Картофель после обработки фунгицидом Инсайд



Таблица 1. Защита картофеля на семенные цели (высокие репродукции)

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Обработка клубней при посадке			
Идикум + Интрада + Скутум* (только в случае высокой численности проволочника)	4 + 1 + (0,2 - 0,3)	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз, серебристая парша; колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней и дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости - 70 - 120 л/га
Гербицидные обработки			
Камелот**	3 - 4	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры после усадки гребней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
На сортах, устойчивых к метрибузину: Лазурит Ультра	0,3	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Обработка картофеля в период вегетации до высоты ботвы 15 см. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Миура	1	Злаковые сорняки	Обработка независимо от фазы развития культуры в случае всходов нескольких «волн» злаковых сорняков или отрастания пырея ползучего. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсектицидные обработки против насекомых-переносчиков вирусов			
Борей Neo	0,15	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Алиот	1,5	Тли	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Скутум	0,07	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Сирокко	2	Тли	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Коллайдер	0,05	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Жукоед Био	0,125 - 0,15	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Фунгицидные обработки			
Спайк + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз	Первая обработка в период активного роста ботвы (развития листьев), начиная с высоты ботвы 15 - 20 см. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Метаксил + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз, альтернариоз	Вторая обработка через 7 - 10 дней после первой, в фазе начала бутонизации - цветения (смыкание рядков). Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Интрада	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Третья обработка через 7 - 10 дней после второй, в фазе цветения - образования клубней в целях профилактики антракноза. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Раэк	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Четвертая обработка через 7 - 10 дней после третьей, в фазе роста клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Спайк + Либертадор	2 + 0,5	Фитофтороз	Пятая обработка через 7 - 10 дней после четвертой, в фазе роста и созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Талант + Ралли	2,5 + 0,5	Фитофтороз, альтернариоз	Шестая обработка в фазе созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Либертадор	0,5	Фитофтороз	Седьмая обработка в фазе созревания клубней и увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Десикация			
Суховей	1	Десикация	Первая обработка за 14 дней до уборки урожая, в фазе увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - не менее 200 л/га
Суховей + Сахара + Полифем	1 + 0,125 + 0,05	Десикация	Вторая обработка за 7 - 10 дней до уборки урожая, в фазе увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - 200 л/га

* - завершается регистрация препарата для применения данным способом

** - завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Защита картофеля для промышленной переработки

Опыт защиты картофеля для промышленной переработки

Тамбовская область, ООО «Тамбовагрофуд»

Сурайкин Иван Николаевич,
главный агроном:

«Препараты компании «Август» мы успешно применяем уже не первый год. Главное направление в производстве картофеля в нашем хозяйстве – это выращивание на переработку. Поэтому можем смело заявить: сегодня у «Августа» есть полностью отработанная схема защиты такого картофеля.

Сначала мы совместно с региональной командой испытывали и проверяли в течение нескольких сезонов отдельные препараты и комплексную систему защиты. Посмотрели на работу продуктов, провели необходимые учеты и приняли решение переходить на «августовскую» защиту. Обсудили все с менеджерами компании, подобрали препараты и их последовательность. Нам рассказали все тонкости применения средств защиты.

Соблюдая рекомендации, мы всегда получаем запланированный результат, этим нам и нравится работа с местной командой «Августа». Сегодня в нашей схеме защиты картофеля препараты фирмы занимают 75 % от всех применяемых СЗР. Например, мы используем: протравители Идикум, Табу Супер; гербициды Гамбит, Лазурит Супер, Миура, Эскудо; фунгициды Инсайд, Либертадор, Ордан МЦ, Раёк, Метаксил, Тирада; инсектицид Скутум, десикант Суховой и адьювант Адью.

«Применяя препараты компании «Август», мы уверены, что гарантированно получим качественный урожай картофеля для переработки».

Применяя препараты компании «Август», мы уверены, что гарантированно получим качественный урожай картофеля для переработки. Это подтверждается хорошими показателями после уборки картофеля.

Мы видим, как портфель компании расширяется и совершенствуется. Поэтому уже в ближайшем сезоне планируем испытывать на своих полях новые препараты: протравитель Рондаш* и фунгициды Спайк и Ралли*.

* – завершается регистрация препарата

И. Н. Сурайкин



С нами расти легче

Поле картофеля под защитой
препаратами «Августа»



Проведение учета развития
ризоктониоза



Уборка урожая
в ООО «Тамбовагрофуд»



И. Н. Сурайкин, И. А. Сурайкина
и «августовцы» оценивают
эффективность протравителей
компании



Таблица 2.

Защита картофеля для промышленной переработки (в т. ч. чипсовых сортов)

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Обработка клубней при посадке			
Идикум + Интранда + Скутум* (только в случае высокой численности проволочника)	4 + 1 + 0,2	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз, серебристая парша; колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней и дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости - 70 - 120 л/га
Гербицидные обработки			
Камелот**	3 - 3,5	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры после усадки гребней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Эскудо + Корсар** + Аллюр	(0,01 - 0,025) + 1,5 + 0,2	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Обработка в период вегетации до высоты ботвы 15 см. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га
Миура	1,2	Злаковые сорняки	Обработка независимо от фазы развития культуры в случае всходов второй «волны» злаковых сорняков или отрастания пырея ползучего. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га
Инсектицидные обработки			
Борей Neo	0,15	Колорадский жук	Обработка по необходимости (при наличии вредителей) совместно со второй или третьей фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Скутум	0,07	Колорадский жук	Опрыскивание культуры при наличии вредителей совместно с третьей или четвертой фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Коллайдер	0,05	Колорадский жук	Опрыскивание культуры при наличии вредителей совместно с четвертой или пятой фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Жукоед Био	0,125 - 0,15	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Фунгицидные обработки			
Спайк + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз	Первая обработка в период активного роста ботвы (развития листьев). Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Метаксил + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз, альтернариоз	Вторая обработка через 7 - 10 дней после первой, в фазе начала бутонизации - цветения (смыкание рядков). Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Интранда	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Третья обработка через 7 - 10 дней после второй, в фазе цветения - образования клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Спайк + Либертадор	2 + 0,5	Фитофтороз	Четвертая обработка через 7 - 10 дней после третьей, в фазе роста клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Раёк	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Пятая обработка через 7 - 10 дней после четвертой, в фазе роста клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Ордан МЦ + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз, альтернариоз	Шестая обработка в фазе роста и созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Талант + Ралли	2,5 + 0,5	Фитофтороз, альтернариоз	Седьмая обработка в фазе роста и созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Либертадор	0,5	Фитофтороз	Восьмая обработка в фазе созревания клубней и увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Десикация			
Суховей + Сахара + Полифем	1 + 0,125 + 0,05	Десикация	Первая обработка за 14 дней до уборки урожая, в фазе увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - не менее 200 л/га
Суховей	1	Десикация	Вторая обработка через 4 - 7 дней после первой. Расход рабочей жидкости - не менее 200 л/га

* - завершается регистрация препарата для применения данным способом

** - завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Защита товарного картофеля

Опыт защиты товарного картофеля

Нижегородская область, ООО «Латкин»

Чудоквасов Алексей Анатольевич,
главный агроном:

«Мы выращиваем картофель на различные цели, из года в год успешно сотрудничая с компанией «Август». Нравится, что ассортимент препаратов постоянно расширяется, можно подобрать необходимые СЗР под свои цели и задачи.

С региональными менеджерами фирмы сложились доверительные отношения. В разгар сезона всегда на связи – помогут и подскажут, исходя из своего опыта. Кроме того, приятно в числе первых проводить технологические испытания новых препаратов на своих полях.

Например, в 2025 году мы с «августовцами» закладывали опыты с протравителями Рондаш* и Байсайд**. В течение сезона проводили учеты эффективности против ризоктониоза. Отмечу, что Рондаш* отлично защитил картофель от этого заболевания, а также от раннего развития фитофтороза, за счет металаксила в составе.

Степень развития ризоктониоза на стеблях в фазе цветения составила 43,1 %, а на хозяйственном варианте достигала 51,4 %. Но самое интересное ждало нас в конце сезона, когда провели копку на определение биологической урожайности. Рондаш* показал прибавку почти в 20 %. Это не может не радовать!

«Новый протравитель «Августа» Рондаш* в испытаниях показал прибавку по урожайности почти в 20 %! Это не может не радовать».

Также отличные результаты в защите от фитофтороза, несмотря на эпифитотию этого сезона, показал фунгицид Спайк. Обработанные участки остались чистыми. Для нас крайне важно, чтобы СЗР действительно работали. Спайк – работает!

Будем и дальше сотрудничать с компанией «Август» и вводить новые препараты в хозяйственную систему защиты картофеля, в том числе и новинки – Рондаш* и Спайк».

* – завершается регистрация препарата

** – завершается регистрация препарата для применения на картофеле

А. А. Чудоквасов



С нами расти легче

Клубни нового урожая на растениях, защищенных Рондашем*



А. А. Чудоквасов и замглавы представительства в г. Кстово Н. В. Дергунов на осмотре опытного участка



А. А. Чудоквасов
в момент уборки

Оценка эффективности
протравителей. Слева – Рондаш*,
справа – хозяйственный вариант



Таблица 3.

Защита товарного картофеля

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Обработка клубней при посадке			
Идикум + Скутум* (только в случае высокой численности проволочника)	4,5 + 0,2	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз; колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней и дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости - 70 - 120 л/га
Гербицидные обработки			
Камелот** или Лазурит Ультра	3,5 или 0,8 - 1,2	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры после усадки гребней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Лазурит Ультра + Эскудо + Аллюр	(0,3 - 0,35) + 0,025 + 0,2	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Обработка картофеля в период вегетации до высоты ботвы 15 см. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Квикстеп	0,8	Злаковые сорняки	Обработка независимо от фазы развития культуры в случае всходов нескольких «волна» злаковых сорняков или отрастания пырея ползучего. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсектицидные обработки			
Борей Нео	0,15	Колорадский жук	Обработка при необходимости (при наличии вредителей) совместно со второй или третьей фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Скутум	0,07	Колорадский жук	Опрыскивание культуры при наличии вредителей совместно с третьей или четвертой фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Коллайдер	0,05	Колорадский жук	Опрыскивание культуры при наличии вредителей совместно с четвертой или пятой фунгицидной обработкой. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Жукоед Био	0,125 - 0,15	Колорадский жук	Профилактическая обработка совместно с фунгицидом. Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Препарат/баковая смесь	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т)	Вредный объект/ назначение	Способ и сроки обработки
Фунгицидные обработки			
Спайк	2,5	Фитофтороз	Первая обработка в период активного роста ботвы (развития листьев). Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Метаксил + Полифем	2,5 + 0,05	Фитофтороз, альтернариоз	Вторая обработка через 7 - 10 дней после первой, в фазе начала бутонизации - цветения (смыкание рядков). Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Интрада	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Третья обработка через 7 - 10 дней после второй, в фазе цветения - образования клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Инсайд + Раёк	1 + 0,4	Фитофтороз, альтернариоз	Четвертая обработка через 7 - 10 дней после третьей, в фазе роста и созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Талант + Эвклид	2,5 + 0,5	Фитофтороз, альтернариоз	Пятая обработка через 7 - 10 дней после четвертой, в фазе роста и созревания клубней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
Десикация			
Суховей + Сахара	0,5 + 0,125	Десикация	Обработка за 14 дней до уборки урожая, в фазе увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - не менее 200 л/га
Суховей	1,5	Десикация	Обработка за 7 дней до уборки урожая, в фазе увядания ботвы. Расход рабочей жидкости - не менее 200 л/га

* - завершается регистрация препарата для применения данным способом
 ** - завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Все для защиты картофеля

**Лучшие решения
для защиты картофеля**

Протравители клубней и дна борозды

Идикум

Индивидуальный подход к защите картофеля

Инсектофунгицидный протравитель клубней картофеля, содержащий ипронион, 133 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + дифеноконазол, 6,7 г/л, выпускается в форме супензионного концентрата.

Преимущества препарата: защита от болезней и вредителей; обеззараживание клубней и почвы и защита проростков благодаря комплексу действующих веществ с системным и контактным действием; отсутствие угнетения и задержки роста и развития растений картофеля; предотвращение развития нематод в зоне действия препарата; из-за отсутствия на рынке прямых аналогов – обязательное включение в антирезистентные программы защиты картофеля от болезней.

Идикум применяют путем обработки клубней и дна борозды во время посадки. Необходимо добиваться полного покрытия клубня препаратом для сдерживания развития инфекции, находящейся на его поверхности и внутри.

Для обработки клубней препарат не необходимо применять в норме от 3 до 4,5 л/га или не менее чем 1 л на тонну семенного материала. В случае приоритетного нанесения на дно борозды

Идикум обеспечивает защиту от болезней и вредителей; обеззараживание клубней и почвы и защиту проростков благодаря комплексу действующих веществ с системным и контактным действием.

использовать строго 4,5 л/га. Для приготовления рабочего раствора препарата рекомендуется использовать воду температурой не ниже 10 °C. Холодная вода снижает диспергируемость препаратов, что может уменьшить эффективность обработки на 30 % и более.

Синклер

Контроль инфекции в почве и на клубнях

Концентрированный фунгицидный протравитель клубней картофеля для борьбы с широким спектром болезней, передающихся с семенами и через почву, а также эффективный против гнилей при хранении. Содержит флудиоксонил, 75 г/л, выпускается в форме супензионного концентрата.

Преимущества препарата: высокая эффективность против ризоктониоза, фузариоза (обработка до и во время посадки), а также гнилей при хранении: фузариозной, фомозной, альтернариозной (обработка перед закладкой на хранение); продолжительный период защиты от почвенных патогенов; иммуномодулирующее действие, обеспечивающее устойчивость проростков к заражению патогенами; концентрированная препаративная форма.

Протравливание клубней картофеля проводят перед закладкой на хранение (семенной картофель) или до и во время посадки. При обработке клубней и борозды при посадке рекомендуется пересчитать норму расхода

С нами расти легче

препарата на гектар, что соответствует дозировке Синклера 0,6 - 0,9 л/га.

Для проправливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей клубни.

Рекомендуется приготовление маточного раствора препарата (требуемое количество проправителя смешать с водой в отдельной емкости, добавляя препарат в воду в соотношении 1:1). Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать воду температурой не ниже 10 °C.

Рондаш*

Потенциал на максимум

Фунгицидный проправитель для всесторонней защиты семенного материала и всходов картофеля. Содержит азоксистробин, 40 г/л + металаксил, 40 г/л + флудиоксонил, 25 г/л, выпускается в высокотехнологичной форме микроЭмульсии.

Преимущества препарата: защита клубней картофеля от возбудителей корневых и стеблевых гнилей, в т. ч. от грибов *Fusarium spp.*; на ранних этапах роста культуры – высокая фунгицидная активность против патогенов из класса Оомицеты, вызывающих фитофтороз клубней и птицезонную гниль.

Контроль других опасных заболеваний, в т. ч. серой гнили, за счет синергии трех активных компонентов; укрепление здоровья растения в целом.

Обеспечивает выровненность и высокую товарность продукции, благодаря чему рекомендован для применения на полях, где выращивают высококачественный картофель для переработчиков или на товарные цели высокого ценового сегмента – под мойку и упаковку.

Обработку семенных клубней проводят заблаговременно (только при наличии высокотехнологичных устройств типа MAFEX) в норме 0,6 л/т или осуществляют обработку клубней и дна борозды при посадке в норме 2 - 3 л/га.

Расход рабочей жидкости: при обработке клубней картофеля – 2 - 3 л/т; клубней и дна борозды при посадке – 70 - 120 л/га.

Байсайд**

Непробиваемая защита семян и проростков

Фунгицидный проправитель со стимулирующим эффектом для всесторонней и длительной защиты клубней и всходов картофеля. Содержит протиоконазол, 40 г/л + флудиоксонил, 30 г/л + азоксистробин, 15 г/л, выпускается в форме водно-супензионного концентрата.

Преимущества препарата: надежная защита растений картофеля от семенной, почвенной и аэрогенной инфекций; одно из лучших решений в борьбе с антракнозом и высокая эффективность против ризоктониоза; три взаимодополняющих действующих вещества из разных химических классов в составе.

Байсайд** рекомендуется включать в схемы проправливания для обработки партий семян, зараженных антракнозом, а также при обнаружении этого патогена в почве. Препарат дополнительно обеспечивает защиту от фузариоза и парши серебристой.

Важно! Проводить обработку семенных клубней перед посадкой следует только при наличии высокотехнологичных устройств. Необходимо исключить способ окуривания клубней в рабочий раствор. При отсутствии соответствующего оборудования проводить обработку Байсайдом** только при посадке.

Также предпосадочная обработка не рекомендуется в случае появления ростков на клубнях, тогда возможно только опрыскивание при посадке в норме 1,2 л/га.

Расход рабочей жидкости при обработке клубней картофеля до посадки – 2 - 10 л/т, клубней и дна борозды при посадке – 70 - 120 л/га.

При использовании при посадке Байсайд** применяют в чистом виде в норме 1,2 - 1,5 л/га либо в смеси Байсайд**, 1,2 л/га + Идикум, 3 л/га. При предпосадочной обработке клубней дозировка препарата – 0,35 - 0,4 л/т.

* – завершается регистрация препарата

** – завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Протравители по фокусному спектру действия

	Идиум	Синклер	Интра	ТМТД ВСК	Бенорад	Ронда*	Байсайд**	Тиацин Био
Ризоктониоз	+	+	+	+	+	+	+	
Антракноз	+						+	
Фузариоз	+	+			+	+	+	
Серебристая парша			+					
Парша обыкновенная				+				+
Бактериозы				+				
Фитофтороз						+		
Питиум						+		
Серая гниль	+	+						
Гнили хранения		+						
Способ применения	При посадке	До и при посадке	При посадке	До и при посадке	При посадке	До и при посадке	До и при посадке	При посадке
Мобильность	Контактно-системный	Контактный	Системный	Контактный	Системный	Контактно-системный	Контактно-системный	Контактный

*- завершается регистрация препарата

** - завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Гербициды

Ассортимент гербицидов «Августа» для защиты картофеля включает почвенные гербициды и препараты для борьбы с сорняками по вегетации, в том числе граминициды. Такой арсенал позволяет решить практически любую проблему с засоренностью поля.

Камелот*

Непреодолимая преграда для сорняков

Двухкомпонентный гербицид почвенного действия против широкого спектра сорняков. Содержит С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л, выпускается в форме суспензионной эмульсии.

Преимущества препарата: уничтожение широкого спектра однолетних двудольных и злаковых сорняков; длительный период защитного действия; отсутствие необходимости заделки (кроме засушливых условий); высокая селективность к культуре; контроль всего спектра сорняков, включая виды с поздними сроками прорастания, в комбинации со страховым гербицидом.

Препарат контролирует свыше 90 видов двудольных сорняков, среди которых: амброзия полыннолистная, горец (виды), горчица полевая, звездчатка средняя, марь белая, осот полевой, пикульник (виды), редька дикая, ромашка (виды), паслен черный, щирица (виды) и др.; а также злаковые: просо куриное, щетинник, росичка и др.

Выпадение небольших осадков после или во время обработки не снижает эффективности препарата. На тяжелых почвах или почвах с высоким содержанием гумуса нужно использовать максимальные нормы расхода Камелота*, так же как и в условиях засушливой весны (возможно, потребуется его заделка в почву). На легких почвах с низким запасом гумуса необходимо снизить норму расхода препарата до 3 л/га.

Корсар*

Сорняки – его добыча

Послевсходовый контактный гербицид против многих видов двудольных сорняков, в том числе

устойчивых к 2,4-Д и МЦПА. Содержит бентазон, 480 г/л, выпускается в форме водорастворимого концентрата.

Преимущества препарата: широкий спектр действия; гибкие сроки применения; хорошая переносимость культурой.

Чувствительны к препарату: горец (виды), редька дикая, лютик полевой, торица полевая, горчица полевая, ярутка полевая, дурнишник (виды), канатник Теофраста, щирица запрокинутая, частуха (виды), лебеда (виды), пупавка (виды), капуста полевая, пастушья сумка, василек синий, подсолнечник, подмаренник цепкий, ромашка (виды). Среднечувствительны: амброзия (виды), марь белая, коммелина (виды), вьюнок полевой, дымянка лекарственная, галинсога мелкоцветная. Слабочувствительны: бодяк полевой, пикульник (виды), яснотка (виды), мак-самосейка, верonica (виды), горец птичий.

Обработку следует проводить в благоприятную для роста растений погоду (от 10 до 25 °C). Не рекомендуется применять препарат, если ожидаются ночные заморозки, а также обрабатывать культуру, испытывающую угнетение вследствие неблагоприятных погодных или иных условий.

Следует добавить в рабочий раствор препарата адьюванта Галоп. Если для приготовления рабочего раствора используется жесткая вода, рекомендуется перед заправкой Корсара* добавлять в воду кондиционер Сойлент, согласно инструкции.

Лазурит Ультра

Долгая защита – сильная культура

Системный гербицид против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков, содержащий метрибузин, 600 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: широкий спектр гербицидной активности; удобная в применении препаративная форма; действие на сорняки через корни и листья; продолжительный защитный эффект; широкий диапазон сроков применения; возможность дробного внесения.

Чувствительны к препарату: амброзия полыннолистная, василек синий, верonica (виды), галинсога мелкоцветковая, горец (виды), горчица полевая, гульянник (виды), дескурайния Софии, метлица полевая, марь (виды), пастушья сумка, пикульник (виды), портулак огородный,

С нами растя легче

просо куриное, ромашка непахучая, редька дикая, чистец однолетний, щирица (виды) и др. Среднечувствительны: паслен черный, падалица рапса, падалица подсолнечника, осот (виды), просо (виды), щетинник (виды). Слабочувствительны: вьюнок полевой, бодяк (виды), подмаренник цепкий, пырей ползучий, овсянка, костер (виды), плевел (виды).

Максимальные дозировки вносят на тяжелых по механическому составу почвах, минимальные – на легких. На песчаных почвах с содержанием гумуса менее 1% использовать Лазурит Ультра не рекомендуется. На почвах с содержанием гумуса более 6%, а также на торфяниках и «заплывающих» землях опрыскивание лучше провести по уже взошедшим сорнякам. Не рекомендуется перемешивание почвы во время обработки и в первые дни после нее. Поверхность почвы должна быть хорошо разделана, без комьев.

Миура

Граминицид бойцовой породы

Селективный системный послевсходовый граминицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Содержит хизалофоп-П-этил, 125 г/л, выпускается в форме концентрата эмульсии.

Преимущества препарата: эффективное уничтожение практически всех видов злаковых сорняков; применение без ограничений по стадиям развития культуры; совместимость в баковых смесях с противодвудольными гербицидами.

Миура контролирует однолетние злаковые сорняки – лисохвост, метлицу, овсянка обыкновенная, просо куриное, щетинник сизый, щетинник зеленый, росичка кроваво-красная, плевел, костер, мятылик однолетний, самосевы зерновых. Также уничтожает многолетние злаковые – пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, канареечник, полевицу белую, мятылик обыкновенный, ветвянку, тростник обыкновенный.

Наилучшие результаты дает опрыскивание активно растущих сорняков. Важно, чтобы на них было достаточно листьев для быстрого поглощения действующего вещества. Однолетние злаковые сорняки опрыскивают в фазе от 2 – 4 листьев до начала кущения, многолетние – в стадии 4 – 6 листьев (высота 10 – 15 см).

Не рекомендуется обрабатывать гербицидом культуры в состоянии стресса из-за различных факторов. Эффективность препарата может

снижаться при выпадении осадков в течение 2 ч после обработки.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адьюванта Галоп.

Фунгициды

Система фунгицидных обработок против основных болезней картофеля – фитофтороза и альтернариоза – должна включать препараты с разным механизмом действия, чтобы эффективно контролировать заболевания на разных этапах, а также предотвратить возникновение у патогенов резистентности.

Инсайд

Фитофтороз побежден!

Комбинированный фунгицид контактного и локально-системного действия, содержащий диметоморф, 200 г/л + флуазинам, 200 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: быстрая остановка развития болезни и продолжительная защита культуры; эффективная профилактика и контроль патогенов благодаря разнонаправленному механизму действия; надежная защита листьев, стеблей и клубней от фитофтороза; устойчивость к смыванию дождем и водой при орошении; идеальный компонент антирезистентных и интегрированных систем защиты.

Опрыскивания картофеля проводят в период вегетации: первое – не позднее фазы смыкания ботвы в рядках, последующие – с интервалом 7 – 10 дней, что обеспечивает надежную защиту от фитофтороза и профилактику альтернариоза.

Применение Инсайда в поздние фазы развития картофеля, в т. ч. совместно с десикацией, помогает предотвратить заражение клубней фитофторозом.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адьюванта Полифем.

* – завершается регистрация препарата для применения на картофеле

Интра

Борец за качество

Высокоэффективный фунгицид, а также проправитель клубней и дна борозды, обладающий профилактическим и лечащим действием. Содержит азоксистробин, 250 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: высокая эффективность против фитофтороза, альтернариоза, ризоктониоза, серебристой парши; усиление активности фотосинтеза, развития корней, столонов и клубней картофеля; двойное действие – контактное и системное; долгий профилактический и лечащий эффект.

На картофеле препарат применяют при посадке или в период вегетации в фазах: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения.

Для защиты от альтернариоза рекомендуется совмещать Интранаду в минимальной норме с препаратами против фитофтороза.

Либертадор

За независимость от фитофторы!

Фунгицид для защиты картофеля от фитофтороза, способный подавлять развитие спор патогена. Содержит циазофамид, 160 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: уникальный механизм действия; отличная эффективность против фитофтороза листьев и клубней картофеля; длительный период защитного действия; высокая стойкость к смыванию дождем и в условиях полива; эффективность против патогенов, устойчивых к препаратам из других химических классов; безопасность для полезных насекомых и клещей.

На картофеле Либертадор рекомендуется применять в рамках двух основных стратегий защиты:

1. Опрыскивание в период остановки активного роста ботвы и наступления благоприятных условий для развития фитофтороза (обычно от цветения – роста клубней до уборки).

2. Опрыскивание в любой период, при вспышке фитофтороза.

Для этого Либертадор необходимо добавить к системному или трансламинарному препарату (Инсайд, Метаксил, Ордан).

Ралли

Здоровые растения – долгое хранение!

Системный фунгицид профилактического и лечащего действия для защиты картофеля. Содержит боскалид, 200 г/л + пираклостробин, 100 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: высокая эффективность против серой и белой гнили в период вегетации, а также против гнилей в период хранения; надежная защита от альтернариоза; отличная совместимость с препаратами против фитофтороза; увеличение срока хранения и качества картофеля, обработанного в конце вегетации.

Ралли применяют двукратно в норме 0,3 – 0,5 л/га. Первое опрыскивание проводят в период появления признаков серой гнили (в большинстве случаев в начале бутонизации), второе – ближе к концу вегетации, для улучшения сохранности урожая. Расход рабочей жидкости – 300 – 400 л/га.

Спайк

Крепкий союз для долгой защиты

Комбинированный контактно-системный фунгицид профилактического и лечащего действия для защиты картофеля от фитофтороза. Содержит пропамокарб гидрохлорид, 400 г/л + цимоксанил, 50 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: контроль всех типов и форм проявления фитофтороза; идеальное встраивание в систему защиты семенного и продовольственного картофеля; предотвращение возникновения резистентности у патогенов благодаря разнонаправленному механизму действия; высокий уровень дождестойкости при орошении и выпадении осадков; низкая токсичность для пчел и другой полезной энтомофауны.

Наилучший эффект достигается при применении Спайка профилактически в начале вегетации при высоте ботвы 20 – 30 см в норме расхода 2,5 л/га.

Опрыскивания рекомендуется проводить блоками с интервалом 7 – 10 дней. В более поздние фазы роста и развития картофеля (после цветения – в начале созревания) или в случае эпифитотии фитофтороза, или при появлении очагов начала развития заболевания в отдельных местах (понижениях) для

усиления «стоп-эффекта» и полноценной защиты культуры необходимо использовать баковую смесь Спайка, 2 л/га с Либертадором, 0,4 – 0,5 л/га.

Следует добавлять в рабочий раствор препарата адьюvant Полифем.

Эвклид

Точный расчет в борьбе с болезнями

Двухкомпонентный фунгицид для защиты от наиболее вредоносных болезней, способствующий увеличению урожайности и качества продукции. Содержит азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: надежная защита от всех видов патогенов, вызывающих альтернариоз

картофеля; комбинация двух высокоэффективных системных действующих веществ из разных химических классов, предотвращающая возникновение резистентности у патогенов; выраженное положительное физиологическое действие на растения; улучшение лежкости картофеля при хранении; безопасность для насекомых- опылителей.

Наилучший защитный эффект обеспечивает применение Эвклида профилактически или при появлении первых признаков болезней. На картофеле в зависимости от региона и погодных условий первую обработку проводят в период, благоприятный для развития альтернариоза, или при проявлении первых признаков болезни, вторую – через 10 – 14 дней или в конце вегетации для снижения развития болезней, а также для защиты картофеля, предназначенного для хранения.

Оптимальная схема фунгицидных обработок

Номер обработки	Базовая схема	Схема при риске раннего развития фитофторы	Схема при запоздалой первой обработке на фоне осадков или туманов	Супер-защита
1	-	Либертадор, 0,4 л/га	-	Либертадор, 0,4 л/га
2	Спайк, 2,5 л/га	Спайк, 2,5 л/га	Спайк, 2,5 л/га + Либертадор, 0,4 л/га	Спайк, 2,5 л/га
3	Метаксил, 2,5 кг/га	Метаксил, 2,5 кг/га	Метаксил, 2,5 кг/га	Метаксил, 2,5 кг/га
4	Инсайд, 1 л/га + Интранада, 0,3 – 0,5 л/га	Инсайд, 1 л/га + Интранада, 0,3 – 0,5 л/га	Инсайд, 1 л/га + Интранада, 0,3 – 0,5 л/га	Инсайд, 1 л/га + Интранада, 0,3 – 0,5 л/га
5	Инсайд, 1 л/га	Инсайд, 1 л/га	Инсайд, 1 л/га	Ордан МЦ, 2,5 кг/га
6	Талант, 3 л/га + Эвклид, 0,5 л/га	Талант, 3 л/га + Эвклид, 0,5 л/га	Талант, 3 л/га + Эвклид, 0,5 л/га	Инсайд, 1 л/га + Раёк, 0,4 л/га
7	Либертадор, 0,5 л/га	Либертадор, 0,5 л/га	Либертадор, 0,5 л/га	Спайк, 2 – 2,5 л/га + Либертадор, 0,4 л/га
8	-	-	-	Инсайд, 1 л/га
9	-	-	-	Талант, 3 л/га + Эвклид, 0,5 л/га
10	-	-	-	Либертадор, 0,5 л/га

Инсектициды

В ассортименте «Августа» есть препараты для борьбы с колорадским жуком из разных классов, что позволяет добиться максимальной эффективности защиты.

Скутум

Неуязвимый щит для ваших культур

Инсектицид пролонгированного контактно-кишечного действия для борьбы с колорадским жуком по вегетации картофеля. Также завершается регистрация препарата в качестве противогнилостного средства клубней и дна борозды при посадке. Содержит фипронил, 250 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: быстрая скорость действия и продолжительный период защиты; эффективность против всех стадий развития колорадского жука; двойное действие – контактное и кишечное; сохранение активности в широком диапазоне температур.

Опрыскивание проводят в период вегетации культуры при появлении вредителей. Для лучшей адгезии и контроля скрытоживущих вредителей рекомендуется добавление в рабочий раствор Скутума адьювантов Полифем или Аллюр.

Препарат высокоопасен для пчел (1-й класс опасности). При обработке необходимо соблюдать следующие правила: оповещение пчеловодов за 4 - 5 суток; проведение обработки вечером после захода солнца, при скорости ветра не более 1 - 2 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 4 - 5 км; ограничение лёта пчел не менее 4 - 6 суток или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток.

Коллайдер

Жуков нет!

Инсектицид, высокоэффективный против колорадского жука. Содержит хлорантранилипрол, 200 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: полный контроль колорадского жука на картофеле – предотвращение

повреждения растений личинками и имаго; высокая овицидная и ларвицидная активность; мгновенная остановка питания вредителя после опрыскивания, длительная защита нового прироста; встраивание в антирезистентные стратегии; высокая дождестойкость; низкая токсичность для пчел.

Опрыскивание проводят в период яйцекладки и отрождения личинок первого возраста.

Препарат малоопасен для пчел (3-й класс опасности). Следует соблюдать правила: оповещение пчеловодов за 4 - 5 суток; обработка утром или вечером при скорости ветра не более 4 - 5 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2 - 3 км; ограничение лёта пчел – не менее 36 - 48 часов.

Жукоед Био

Картофель под защитой!

Инсектицид биологического происхождения для контроля колорадского жука. Содержит спиносад, 240 г/л, выпускается в форме суспензионного концентрата.

Преимущества препарата: контроль популяций колорадского жука, устойчивых к пиретроидам и неоникотиноидам; высокая скорость действия, длительная защита; малая опасность для человека и короткий срок ожидания; стабильная эффективность в жару и высокая дождестойкость.

Опрыскивание проводят в период вегетации. При выращивании картофеля по интенсивным технологиям препарат можно использовать для завершающих обработок.

Препарат высокоопасен для пчел (1-й класс опасности). Следует соблюдать правила: обработка растений ранним утром или вечером, при скорости ветра не более 1 - 2 м/с; погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км; ограничение лёта пчел – не менее 4 - 6 суток или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток.

С нами растя легче

Десиканты

Сахара работает медленнее, чем дикват, обеспечивая равномерный отток пластических веществ к урожаю, но при этом позволяет подобрать оптимальные сроки уборки.

Сахара

Подсушит культуру, засушит сорняки

Десикант и трансламинарный гербицид против однолетних двудольных сорняков, содержащий карфентразон-этил, 480 г/л, выпускается в форме концентрата эмульсии.

Преимущества препарата: использование в качестве десиканта или гербицида; контроль двудольных сорняков (в т. ч. вьюнка); ускорение процесса созревания урожая, повышение его качества; высокая дождестойкость.

При гербицидной обработке до всходов картофеля, в отличие от гербицидов на основе глифосата, Сахара идеально подходит для семеноводческих посадок.

При десикации Сахара работает медленнее, чем дикват, обеспечивая равномерный отток пластических веществ к урожаю, но при этом позволяет подобрать оптимальные сроки уборки. Препарат уничтожает сорняки, оставшиеся в посевах (например, вьюнок), имеет короткий срок ожидания (4 дня), не накапливается в урожае.

При десикации картофеля расход рабочего раствора должен быть не менее 300 л/га. Если ботва плотная – следует увеличить давление в системе опрыскивателя. Если погода прохладная и пасмурная – увеличивать давление и норму расхода препарата не рекомендуется; при засушливой погоде нужно использовать только инжекторные форсунки.

Если картофель активно отрастает после обработки, может потребоваться второе опрыскивание. В зависимости от условий можно применить Сахару последовательно или в смеси с Суховеем.

Воду для рабочего раствора следует подготовить с помощью кондиционера Сойлент. Рабочий раствор Сахары нужно использовать в максимально короткие сроки!

Суховей

Высушит быстро, сохранит без потерь

Десикант, а также гербицид для борьбы с сорняками до посадки картофеля. Содержит дикват в форме дикват-дигромида, 280 г/л (150 г/л в пересчете на дикват-ион), выпускается в форме водного раствора.

Преимущества препарата: быстрое действие – возможность начать уборку уже через 5 - 7 дней после опрыскивания; высокая дождестойкость; возможность управления сроками уборки вне зависимости от погодных условий; облегчение уборки благодаря подсушиванию зеленой массы сорняков; уменьшение распространения и развития болезней картофеля.

Опрыскивание проводят в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Препарат поможет высушить культуру быстро, а также уничтожит проблемные сорняки.

Он обладает очень быстрым действием, не смывается дождем уже через 10 - 15 мин. после обработки, поэтому с его помощью можно эффективно управлять уборкой урожая даже в дождливую погоду. Оптимальные температуры при опрыскивании Суховеем – от 15 до 25 °C. В солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается. Срок ожидания на картофеле – 12 дней. Для приготовления раствора необходимо использовать только чистую воду!

Принципы проведения десикации картофеля

1. Ботва картофеля может начать увядать до десикации.
2. На посадках с сильно развитой ботвой возможно будут необходимы несколько последовательных обработок десикантами или применение их смеси.
3. На картофеле для длительного хранения рекомендуется использовать Сахару отдельно или в сочетании с Суховеем.
4. Десикацию следует проводить в солнечную погоду с утра до полудня, при этом использовать двухфакельные инжекторные форсунки. Очень важно обеспечить качественное покрытие растений раствором.
5. Для Сахары оптimalен увеличенный расход рабочего раствора – 300 л/га.
6. Следует соблюдать семидневные интервалы между обработками фунгицидами против фитофтороза, несмотря на срок десикации.
7. Срок ожидания у Сахары – 4 дня. Тем не менее, дата уборки должна определяться по степени огрубления кожуры картофеля.

Варианты обработок

Первый вариант, первая обработка – Суховей, 1 - 2 л/га (открытие полога; не менее чем за 14 дней до уборки); вторая обработка – Сахара, 0,125 л/га (окончательное подсушивание; в течение последующих 7 - 10 дней).

Второй вариант, первая обработка – Сахара, 0,125 л/га (не менее чем за 14 - 21 день до уборки); вторая обработка – Суховей, 1 - 2 л/га (окончательное подсушивание; в течение последующих 7 дней).

Третий вариант – Сахара, 0,125 л/га (однократно; не менее чем за 14 - 21 день до уборки).

Четвертый вариант – Сахара, 0,125 л/га + Суховей, 1л/га (однократно; не менее чем за 14 дней до уборки).

Опыты по применению десикантов

Красноярский край, Сахара, 0,125 л/га + Адью 0,2%-ный р-р через 5 суток



Красноярский край, контроль без обработки на ту же дату



Московская область, сильнооблиственный сорт, контроль без обработки



Московская область, опыт по двухфазному применению: Суховей, 1л/га (за 14 дней до уборки) + Суховей, 1л/га еще через 7 дней



Таблица 4.

Перечень препаратов компании «Август», рекомендованных для применения на картофеле

Название препарата	Действующее вещество; препартивная форма	Норма расхода, л(кг)/га(т)	Вредный объект/назначение
Протравители			
Байсайд*	Протиоконазол, 40 г/л + флудиоксонил, 30 г/л + азоксистробин, 15 г/л; водно-сuspензионный концентрат	0,35 - 0,4 (обработка клубней перед посадкой); 1,2 - 1,5 (обработка клубней и дна борозды при посадке)	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз, парша обыкновенная, парша серебристая
Бенорад	Беномил, 500 г/кг; смачивающийся порошок	0,5 - 1	Ризоктониоз (семенной картофель)
Идикум	Ипродион, 133 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + дифеноконазол, 6,7 г/л; супензионный концентрат	3 - 4,5	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз; колорадский жук, тли, проволочники
Интрада	Азоксистробин, 250 г/л; супензионный концентрат	1	Ризоктониоз, серебристая парша
Рондаш**	Азоксистробин, 40 г/л + металаксил, 40 г/л + флудиоксонил, 25 г/л; микроЭмульсия	0,6 - 1 (обработка клубней перед посадкой); 2 - 3 (обработка клубней и дна борозды при посадке)	Ризоктониоз, фузариоз антракноз, парша обыкновенная, парша серебристая
Синклер	Флудиоксонил, 75 г/л; супензионный концентрат	0,2 - 0,3	Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, альтернариозная, мокрая бактериальная; ризоктониоз, фузариоз (обработка до и во время посадки)
Скутум***	Фипронил, 250 г/л; супензионный концентрат	0,2 - 0,4	Проволочники, подгрызающие совки, хрущи
Табу Супер	Имидаклоприд, 400 г/л + фипронил, 100 г/л; супензионный концентрат	0,4 - 0,6	Проволочники, колорадский жук, тли
ТМТД ВСК	Тирам, 400 г/л; водно-супензионный концентрат	4 - 5	Фитофтороз, ризоктониоз, обыкновенная парша, мокрая бактериальная гниль, сухая фузариозная гниль

Название препарата	Действующее вещество; препартивная форма	Норма расхода, л(кг)/га(т)	Вредный объект/назначение
Гербициды			
Видфайтер**	Флуазифоп-П-бутил, 150 г/л; концентрат эмульсии	0,75 - 1 1,5 - 2	Однолетние злаковые Пырей ползучий
Гербитокс*	МЦПА кислота (смесь диметиламинной, калиевой и натриевой солей), 500 г/л; водорастворимый концентрат	0,6 - 1,2	Однолетние двудольные сорняки
Камелот*	С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л; супензионная эмульсия	3 - 4	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Квикстеп	Клетодим, 130 г/л + галоксифоп-П-метил, 80 г/л; масляный концентрат эмульсии	0,4 - 0,8	Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Корсар*	Бентазон, 480 г/л; водорастворимый концентрат	1,5	Однолетние двудольные сорняки
Лазурит Супер	Метрибузин, 270 г/л; концентратnanoэмульсии	0,9 + (0,35 - 0,55); 1 - 1,3	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Лазурит Ультра	Метрибузин, 600 г/л; супензионный концентрат	0,8 - 1,6; (0,6 - 1,2) + 0,35; 0,8 - 0,9	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Нексус*	Фомесафен, 240 г/л; водный раствор	1 - 1,25	Однолетние двудольные сорняки
Трейсер	Кломазон, 480 г/л; концентрат эмульсии	0,25 - 0,5	Однолетние двудольные сорняки
Миура	Хизалофоп-П-этил, 125 г/л; концентрат эмульсии	0,4 - 1,2	Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Торнадо 500	Изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты; водный раствор	1,5 - 4	Злаковые и двудольные сорняки
Торнадо 540	Калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л к-ты; водный раствор	1,4 - 4	Злаковые и двудольные сорняки
Суховей	Дикват, 150 г/л. Содержит дикват в форме дикват-дигромида, 280 г/л (150 г/л в пересчете на дикват-ион); водный раствор	1 - 2	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Сахара	Карфентразон-этил, 480 г/л (в пересчете на карфентразон к-ты); концентрат эмульсии	0,03	Однолетние двудольные, в т. ч. подмаренник цепкий, просвирник и другие (на всех сортах картофеля, кроме среднеспелых и позднеспелых)
Эскудо	Римсульфурон, 500 г/кг; водно-диспергируемые гранулы	0,01 - 0,025	Многолетние (пырей) и однолетние злаковые и двудольные сорняки

Название препарата	Действующее вещество; препаративная форма	Норма расхода, л(кг)/га(т)	Вредный объект/назначение
Фунгициды			
Балий*	Пропиконазол, 180 г/л + азоксистробин, 120 г/л; концентрат микроэмulsionи	0,8 - 1	Альтернариоз
Инсайд	Диметоморф, 200 г/л + флуазинам, 200 г/л; супензионный концентрат	0,8 - 1	Фитофтороз
Интрада	Азоксистробин, 250 г/л; супензионный концентрат	0,6 - 0,8	Альтернариоз, фитофтороз
Кумир	Сульфат меди трехосновный, 345 г/л; супензионный концентрат	5	Фитофтороз, альтернариоз
Либертадор	Циазофамид, 160 г/л; супензионный концентрат	0,4 - 0,5	Фитофтороз
Метаксил	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг; смачивающийся порошок	2 - 2,5	Фитофтороз, альтернариоз
Ордан	Хлорокись меди, 689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг; смачивающийся порошок	2 - 2,5	Фитофтороз, альтернариоз
Ордан МЦ	Манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг; смачивающийся порошок	2 - 2,5	Фитофтороз, альтернариоз
Раек	Дифеноконазол, 250 г/л; концентрат эмульсии	0,3 - 0,4	Альтернариоз
Ралли	Боскалид, 200 г/л + пираклостробин, 100 г/л; супензионный концентрат	0,3 - 0,5	Альтернариоз
Спайл	Пропамокарб гидрохлорид, 400 г/л + цимоксанил, 50 г/л; супензионный концентрат	2 - 2,5	Фитофтороз
Талант	Хлороталонил, 500 г/л; супензионный концентрат	2,2 - 3	Альтернариоз, фитофтороз
Тирада	Тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л; супензионный концентрат	3 - 4	Альтернариоз, фитофтороз
Эвклид	Азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л; супензионный концентрат	0,4 - 0,5	Альтернариоз
Регуляторы роста			
Трафик	Калиевая соль малеинового гидразида, 270 г/л; водорастворимый концентрат	12 - 15	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции

Название препарата	Действующее вещество; препаративная форма	Норма расхода, л(кг)/га(т)	Вредный объект/назначение
Инсектициды			
Алиот	Малатион, 570 г/л; концентрат эмульсии	1,5	Тли (семенной картофель)
Аспид*	Тиаклоприд, 480 г/л; супензионный концентрат	0,1 - 0,15	Колорадский жук, тли-переносчики вирусных заболеваний
Борей	Имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л; супензионный концентрат	0,08 - 0,12	Колорадский жук
Борей Нео	Альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л; супензионный концентрат	0,1 - 0,15	Колорадский жук
Жукоед Био	Спиносад, 240 г/л; супензионный концентрат	0,125 - 0,15	Колорадский жук
Коллайдер	Хлорантранилипирол, 200 г/л; супензионный концентрат	0,04 - 0,05	Колорадский жук
Мамба	Альфа-циперметрин, 150 г/л; концентрат эмульсии	0,05 - 0,07	Колорадский жук
МатринБио	Матрин, 5 г/л; водный раствор	1 - 1,5	Колорадский жук
Сирокко	Диметоат, 400 г/л; концентрат эмульсии	2	Тли (семенной картофель)
Скутум	Фипронил, 250 г/л; супензионный концентрат	0,06 - 0,07	Колорадский жук
Танрек	Имидаклоприд, 200 г/л; водорастворимый концентрат	0,1	Колорадский жук
Шарпей	Циперметрин, 250 г/л; микроэмulsionия	0,1 - 0,16; 0,48	Колорадский жук, картофельная моль; тли-переносчики вирусных заболеваний (семенной картофель)
Десиканты			
Суховей	Дикват, 150 г/л. Содержит дикват в форме дикват-дибромида, 280 г/л (150 г/л в пересчете на дикват-ион); водный раствор	2	Десикация
Сахара	Карфентразон-этил, 480 г/л (в пересчете на карфентразон к-ту); концентрат эмульсии	0,1 - 0,125	Десикация, в т. ч. с помощью авиации

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре

** – завершается регистрация препарата

*** – завершается регистрация препарата для применения данным способом

Таблица 5.

Классификация механизмов действия действующих веществ препаратов с указанием кода резистентности

Действующее вещество	Химический класс	Группа резистентности	Механизм действия
Гербицидные действующие вещества			
Бентазон	Производные тиадиазинов	6	Ингибитор фотосинтеза на фотосистеме II; D1 связывающие гистидин 215
Галоксифоп-П-метил	Арилоксфеноксипропионаты	1	Ингибитор ацетил-СоА-карбоксилазы (ACCase)
Глифосата кислота и ее соли	Фосфорорганические соединения	9	Ингибитор синтеза ароматических аминокислот в результате подавления фермента – 5-энолопиривил-шикимат-3-фосфатсинтетазы
Дикват	Производные бипиридилия	22	Перенаправление электронов фотосистемы I
Карфентразон-этил	Триазолиноны	14	Ингибитор протопорфирина-генооксидазы (PPO)
Клетодим	Циклогександионы	1	Ингибитор ацетил-СоА-карбоксилазы (ACCase)
Кломазон	Изоксазолидиноны	13	Ингибитор дезокси-D-ксилулозы фосфатсинтазы (DXPS)
Метрибузин	Триазиноны	5	Ингибитор фотосинтеза на фотосистеме II; D1 связывающие серин 264 (и другие негистидиновые связывающие 215)
МЦПА кислота	Феноксикарбоксилаты	4	Ауксиноподобный регулятор роста растений

Действующее вещество	Химический класс	Группа резистентности	Механизм действия
Прометрин	Триазины	5	Ингибитор фотосинтеза на фотосистеме II; D1 связывающие серин 264 (и другие негистидиновые связывающие 215)
Римсульфурон	Сульфонилмочевины	2	Ингибитор ацетолактатсинтетазы (ALS-блокатор)
С-метолахлор	Хлорацетамиды	15	Ингибитор синтеза длинноцепочечных жирных кислот (VLCFA)
Тербутилазин	Триазины	5	Ингибитор фотосинтеза на фотосистеме II; D1 связывающие серин 264 (и другие негистидиновые связывающие 215)
Фомесафен	Дифениловые эфиры	14	Ингибитор протопорфирина-генооксидазы (PPO)
Флуазифоп-П-бутил	Арилоксфеноксипропионаты	1	Ингибитор ацетил-СоА-карбоксилазы (ACCase)
Хизалофоп-П-этил	Арилоксфеноксипропионаты	1	Ингибитор ацетил-СоА-карбоксилазы (ACCase)
Фунгицидные действующие вещества			
Азоксистробин	Метоксиакрилаты (стробилурины)	11	Ингибиторы митохондриального дыхания (QoI)
Беномил	Бензимидазолы	1	Ингибиторы митоза и деления клеток. Нарушение полимеризации тубулина
Боскалид	Пиридинкарбоксамиды	7	Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы ферментного комплекса II
Диметоморф	Амиды коричной кислоты	40	Ингибиторы синтеза целлюлозы
Дифеноконазол	Триазолы	3	Ингибиторы биосинтеза эргостерола
Манкоцеб	Тиокарбаматы	M03	Нарушение критических биохимических процессов, таких как липидный обмен, дыхание и ферментативная функция, посредством инактивации сульфидильных групп и механизмов обмена металлов

Действующее вещество	Химический класс	Группа резистентности	Механизм действия
Металаксил	Фениламиды	4	Ингибитор синтеза нуклеиновых кислот
Пираклостробин	Метоксикарбаматы (стробилурины)	11	Ингибиторы митохондриального дыхания (Qo1)
Пропамокарб гидрохлорид	Карбаматы	28	Ингибиторы биосинтеза липидов (нарушение функций клеточных мембран)
Пропиконазол	Триазолы	3	Ингибиторы биосинтеза эргостерола
Протиоконазол	Триазолы	3	Ингибиторы биосинтеза эргостерола
Сульфат меди трехосновный	Неорганические вещества, соли меди	M01	Разрушение клеточных мембран, ингибирование активности ферментов, образование активных форм кислорода
Тирам	Тиокарбаматы	M03	Многоцелевая контактная активность (воздействие на ферментативные процессы в клетках, подавление дыхания и выработки энергии, образование активных форм кислорода)
Флуазинам	Пirimидинамины	29	Деструктор окислительного фосфорилирования
Флудиоксонил	Фенилпирролы	12	Ингибиторы транспортноассоциированного фосфорилирования глюкозы. Нарушение работы НК (гистидинкиназы)
Хлорокись меди	Неорганические вещества, соли меди	M01	Многоцелевая контактная активность (воздействие на дыхательные процессы, подавление синтеза белка)
Хлороталонил	Хлоронитрилы	M05	Многоцелевая контактная активность, направленная на нарушения жизненно важных метаболических процессов
Циазофамид	Цианоимидазолы	21	Ингибиторы митохондриального дыхания (Qi)
Цимоксанил	Цианоацетамидоксимы	27	Ингибиторы биосинтеза РНК в клетках патогенов

Действующее вещество	Химический класс	Группа резистентности	Механизм действия
Инсектицидные действующие вещества			
Альфа-циперметрин	Пиретроиды	За	Модулятор натриевых каналов. Нейротоксическое действие
Диметоат	Фосфорорганические соединения	1b	Ингибитор ацетилхолинэстеразы. Нейротоксическое действие
Имидаклоприд	Неоникотиноиды	4a	Конкурентный модулятор никотинацетилхолинового рецептора (nachr). Нейротоксическое действие
Клотианидин	Неоникотиноиды	4a	Конкурентный модулятор никотинацетилхолинового рецептора (nachr). Нейротоксическое действие
Лямбда-цигалотрин	Пиретроиды	За	Модулятор натриевых каналов. Нейротоксическое действие
Малатион	Фосфорорганические соединения	1b	Ингибитор ацетилхолинэстеразы. Нейротоксическое действие
Спиносад	Макроциклические лактоны	5	Аллостерический модулятор никотинацетилхолинового рецептора (nachr), воздействие на сайт 1. Нейротоксическое действие
Тиаклоприд	Неоникотиноиды	4a	Конкурентный модулятор никотинацетилхолинового рецептора (nachr). Нейротоксическое действие
Фипронил	Фенилпиразолы	2b	Блокировка гамк-зависимого хлоридного канала. Нейротоксическое действие
Хлоран-транилипирол	Диамиды	28	Модулятор рианодинового рецептора. Нейротоксическое и мышечное действие
Циперметрин	Пиретроиды	За	Модулятор натриевых каналов. Нейротоксическое действие

Контакты

Центральный офис

129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6
(495) 787-08-00
avgust.com

Специалисты в центральном офисе

Владимир Барков
(903) 108-54-31

Александр Аниськов
(916) 335-94-26

Дмитрий Белов
(903) 109-77-69

Иван Тучков
(915) 162-40-89

Региональные представители

Алексей Старшов
Брянская, Калужская, Московская,
Рязанская, Смоленская области
(916) 903-61-89

Александр Толчеников
Брянская область
(980) 332-15-56

Алексей Шуляк
Тульская область
(910) 581-55-27

Дмитрий Горожанин
Нижегородская область
(920) 001-33-26

Софья Енина
Ставропольский край
(961) 488-98-66

Аркадий Особливый
Области Северо-Западного
федерального округа
(960) 208-01-05

Александр Абакумов
Астраханская область
(927) 568-11-34

Вадим Жуков
Тверская область,
Московская область (север)
(921) 388-29-54

Дмитрий Болтушкин
Орловская область
(915) 500-92-65

Александр Крюков
Тамбовская область
(915) 880-15-16

Александр Рябцев
Красноярский край
(902) 911-77-02

Сергей Зайцев
Приморский край
(914) 962-60-53

Сервисы компании «Август»



Каталог продукции
для **Android**



Каталог продукции
для **iOS**



Приложение
«Август Чекер»
для **Android**



Приложение
«Август Чекер»
для **iOS**



Телеграм-бот
«Август Чекер»



Газета
«Поле Августа»



Другие медиаресурсы
«Августа»

Материалы брошюры подготовили:



начальник
департамента
маркетинга
Дмитрий Белов
(903) 109-77-69
d.belov@avgust.com



начальник отдела
развития продуктов
Владимир Барков
(903) 108-54-31
v.barkov@avgust.com



руководитель
группы картофеля
Александр Анисьев
(916) 335-94-26
a.aniskov@avgust.com



специалист группы
картофеля
Иван Тучков
(915) 162-40-89
i.tuchkov@avgust.com

Редакторы:

Ольга Рубчик
Александра Емельянова
Сергей Жихарев
Анастасия Попова

Дизайн, верстка и цветокоррекция фото:

Ольга Сейфутдинова

Фото:

архив компании «Август»
Александр Хютти
shutterstock.com



